


Ящур – особо опасная инфекционная, остро протекающая и быстро распространяющаяся болезнь парнокопытных животных, вызываемая одним из вариантов вируса типов О, А, С, САГ-1, САГ-2, САГ-3 и Азия-1. Ящуром может болеть и человек.




Что является источником заболевания?

Источником инфекции являются больные ящуром животные. Такие животные выделяют вирус во внешнюю среду с молоком, слюной, выдыхаемым воздухом, мочой и фекалиями.


Как происходит заражение?

Возбудитель заносится при поступлении на фермы больных или переболевших животных, при контактах с больными животными, в том числе с ликами, при пастбище, водопое, перегонах, с инфицированными кормами, водой, а также молоком при выпавании телят, при завозе продуктов убоя больных животных, использование в корм необезвреженных пищевых отходов, при распространении ветром, с инфицированными предметами ухода, одеждой и обувью людей, транспортными средствами.



Как предотвратить заражение ящуром?

- При выявлении внешних признаков заболевания у животных или ветеринарную специалисту;
- не заниматься самолечением, при обнаружении трупа не подходить;
- соблюдать установленные ветеринарные и санитарные правила;
- не приобретать животных без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие местности и здоровье животных;
- по требованию ветеринарных специалистов предоставлять животных для проведения клинического обследования;
- оповещать государственную ветеринарную службу о новых приобретенных животных;



Основными признаками является: снижение аппетита и унетение, учащение пульса и дыхания, хромота, судороги, неестественные позы, лихорадка, слюнотечение, образование афт (небольшие нарывы, язвы) на слизистой оболочке ротовой полости, на коже конечностей, в области венчика и вымени. Смерть взрослых животных наступает через 5-14 дней, молодняка – через 1-2 суток.